Ріджбек 150 СЕ інсектицид для захисту зернових колосових культур, сої, кукурудзи від основних шкідників.

Новий інсектицид Ріджбек™ 150 СЕ

Назва препарату	Ріджбек™
Діюча речовина	Ізокласт™, 37 г/л + біфентрин, 112 г/л
Препаративна форма	Суспо емульсія
Культури в реєстрації	**Зернові колосові культури, Соя, Кукурудза (реєстрація 2024)** **Соняшник** (2025) **Горох (2025)**
Норма препарату	0,3 – 1,0 л/га
Упаковка	1 л
Виробник	Corteva

- Потужна контактна дія завдяки збільшеній нормі біфентрину
- Посилена дія на сисну групу шкідників завдяки Isoclast™
- Тривала дія завдяки персистентності біфентрину на рослинах

Загальний опис

Новий інсектицид **Ріджбек™** створений на основі двох діючих речовин інноваційного ***Isoclast*** та ***біфентрину***, що належать до різних хімічних класів: сульфоксафлори група 4C та піретроїди група 3A.

Діє шляхом контакту та через кишкову дію, характеризується трансламінарним та системним рухом. Препарат характеризується посиленою дією

Швидкий нокдаун ефект, швидка зупинка харчування та пролонгована дія. Контролює широкий спектр сисних та листогризучих шкідників на ряді основних с/г культур. Особливо інсектицид забезпечує посилену дію проти різних видів попелиць, які одночасно можуть бути присутні з іншими видами шкідників.

Культури, об’єкти та норми в етикетці

Культура	Норма витрати препарату	Шкідливий об’єкт
Пшениця, ячмінь	0,3-0,4 л/га	клоп шкідлива черепашка, попелиці, п’явиці, трипси
Кукурудза	0,3-0,5 л/га	Діабротіка (імаго) , попелиці
Соя	0,3-0,75 л/га	Комплекс шкідників

Розширення реєстрації Ріджбек 2025

Культура	Норма витрати препарату	Шкідливий об’єкт
Соняшник	0,3-0,5 л/га	Попелиці, клопи
Горох	0,3-0,5 л/га	Попелиці, горохова зернівка

Механізм дії

Isoclast - Наразі єдиний у класі сульфоксимінів та відноситься до підгрупи 4C. Контролює всі види попелиць, включаючи найбільш проблемні види, включаючи стійких популяцій до інших інсектицидів. Діє шляхом контакту та через кишкову дію, характеризується трансламінарним та системним рухом. Швидкий нокдаун ефект, швидка зупинка харчування, пролонгована дія, чудовий екологічний профіль та унікальний механізм дії



Isoclast™ active

Механізм дії

Біфентрин – володіє найширшим спектром активності порівняно до інших піретроїдів. Контролює представників з ряду лускокрилих, рівнокрилих, жорсткокрилих та кліщів. Біфентрин забезпечує найдовший період захисту порівняно до інших представників групи 3А внаслідок уповільнення напіврозпаду. Проявляє високу стабільність під дією сонячного випромінення та стійкий до змивання.

Цільові об’єкти

Висока ефективність проти широкого спектру сисних та листогризучих шкідників:

- **Рівнокрилі:** попелиці. Неперевершена ефективінсть!!!
- **Лускокрилі:** молі, совки
- **Жорсткокрилі:** Діабротіка та інш
- **Напівжорсткокрилі:** клопи
- **Трипси:** пшеничний трипс
- **Кліщі:** павутинний кліщ

Технічні характеристики

- Активність проти широкого спектра шкідників.
- Посилена дія проти всіх попелиць!!!
- Швидкий нокдаун ефект, швидке припинення харчування та тривалий період контролю.
- Системна та трансламінарна дія.
- Яскраво виражена акаріцидна дія
- Мінімальний вплив на корисних комах та бджіл при дотриманні рекомендацій на етикетках.



ВИКОРИСТАННЯ НА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУРАХ

У випадку сильного заселення посівів злаковими попелицями

- ✓ **Клоп шкідлива черепашка** (*Eurygaster integriceps*)
- ✓ **Попелиці** (*Aphis sp.*)
- ✓ **Пшеничний трипс** (*Haplothrips tritici*),
- ✓ **П'явиці** (*Oulema melanopus, Oulema lichenis*)
- ✓ **Хлібні жуки**

Норма використання – 0,3-0,4 л/га



ВИКОРИСТАННЯ НА КУКУРУДЗІ

- ✓ **Західний кукурудзяний жук (імаго)** (*(Diabrotica virgifera virgifera)*)
- ✓ **Попелиці** (*Aphis sp.*)

.

Норма використання – 0,3-0,5 л/га

Період застосування
Вихід волоті - цвітіння кукурудзи в період появи шкідників.

Ріджбек 0,3-0,5 л/га



Шкодочинність на кукурудзі

Західний кукурудзяний жук

РЕКОМЕНДОВАНО РІДЖБЕК!!!!

Попелиці

ВИКОРИСТАННЯ НА СОЇ

- ✓ **Кліщі** (*Tetranychus urticae* Koch)**.**

Норма використання 0,75 л/га

.

- ✓ Попелиці (*Aphies* sp)**.**
- ✓ Бавовникова совка (*Helicoverpa amigera*)
- ✓ Акацієва вогнівка (*Etiella zjnckenella*)
- ✓ Чортополохівка (*Vanessa cardui*)

Норма використання – 0,3-0,5 л/га

Реєстрація: 2025 р.

Кліщі

Ріджбек 0,75 л/га



Ріджбек – висока ефективність проти попелиці на горосі



Реєстрація очікується на горосі!

Ріджбек переваги застосування

- ✓ Ефективний проти широкого спектру шкідників
- ✓ Посилена дія **проти видів попелиць**!!!
- ✓ Висока швидкість контактної дії (від декількох секунд до декількох хвилин)
- ✓ Шлункова та контактна дія
- ✓ Володіє акарицидною дією
- ✓ Надійний засіб для контролю шкідників, які знаходяться у важкодоступних місцях
- ✓ Стабільний на сонячному світлі
- ✓ Стійкий до змивання опадами

Дякую за увагу!